



## Magneettitutkimus nukutuksessa

Voitteko ystävällisesti täyttää kaikki teille lähetetyt paperit ennen poliklinikalle tuloa.

### Tutkimuksen tarkoitus

Magneettitutkimuksella saadaan tarkkoja kuvia elimistöstä ilman röntgensäteilyä. Magneettitutkimus tehdään aina lähettävän lääkärin ohjeiden mukaisesti ja myös vastaus menee lähettävälle lääkärille.

### Valmistautuminen

Ennen anestesiaa on oltava syömättä 6 tuntia, mukaan lukien kaikki maitotuotteet ja äidinmaidonkorvike. Rintamaitoa saa nauttia vielä 4 tuntia ennen anestesiaa. Lapsi saa sammuttaa janonsa vedellä tai kirkkailla mehuilla vielä 1 tunti ennen ilmoittautumisaikaa poliklinikalle. Sen jälkeen on oltava juomatta. Säännöllinen lääkitys tulee ottaa ajallaan janon sammuttamiseen sopivan nesteen kera. Allekirjoita lomake koskien ravinnotta oloa.

Huom! Lapsen tulee olla terve tutkimuspäivänä. Jos lapsella on oireita kuten yskää tai nuhaa, ystävällisesti ota yhteyttä lastenpoliklinikalle.

### Tutkimuksen kulku

Poliklinikalla lapselle laitetaan kanyyli. Tutkimus tapahtuu röntgenosastolla. Lapselle annetaan nukutuslääkettä kanyyliin, jotta lapsi nukkuu tutkimuksen ajan. Kanyylin kautta voidaan antaa myös varjoainetta. Vanhemmat saavat mennä lapsen kanssa röntgeniin ja tarvittaessa heräämään tutkimuksen jälkeen.

Tutkimus kestää 30-60 minuuttia.

### Jälkihoito

Kun lapsi palaa poliklinikalle, hän saa syödä ja juoda voinnin mukaan. Kotiin saa lähteä, kun vointi on hyvä.

### Huomioitavaa

Lue tarkasti myös ohessa olevat liitteet Esitiedot anestesiaa varten ja Esitiedot magneettitutkimusta varten.



Pohjanmaan hyvinvointialue • [www.pohjanmaanhyvinvointi.fi](http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi) • Vaihde 06 218 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.