



Rautalisän annostelu kotihoidossa

Niferex® 30mg/ml; 1,5mg/gtt

Pullokokoko 30ml

Perusannostus 2mg/kg/vrk ja maksimiannos 15mg /vrk

Rautalääkitys aloitetaan 3 – 4 viikon iässä lapsille, joiden syntymäpaino on alle 2,5kg. Annostetaan painon mukaan. Hb kontrolli neuvolassa tai vauvapkl:lla 2-3 kk:n iässä ja sen jälkeen tarpeen mukaan. Rautalisän kesto 12 kk

Lääkitystä ei tarvitse lopettaa hampaiden puhkeamisen takia, Niferex® värjäntymät lähtevät hammasharjalla. Valmisteen vaihtoa toiseen vatsavaivojen takia ei suositella, muut valmisteet saattavat jättää pysyvän värin hampaisiin.

Rautalisän annostelu

- 2kg 3 tippaa x 1 = 4,5mg = 0,15ml
- 3kg 4 tippaa x 1 = 6mg = 0,2ml
- 4kg 5 tippaa x 1 = 7,5mg = 0,25ml
- 5kg 7 tippaa x 1 = 10,5mg = 0,35ml
- 6kg 8 tippaa x 1 = 12mg = 0,4ml
- yli 7kg 10 tippaa x 1 = 15mg = 0,5ml

Pohjanmaan hyvinvointialue • www.pohjanmaanhyvinvointi.fi • Vaihde 06 218 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.