



Järndosering hemma

Niferex® 30mg/ml; 1,5mg/gtt

Flaskstorlek 30ml

Järnmedicinering påbörjas vid 3 – 4 veckors ålder åt barn med födelsevikt under 2,5kg. Dosen höjs enligt vikten. Hb kontroll på rådgivningen eller babyenkelt vid 2-3 månaders ålder och därefter enligt behov. Järntillskottet ges under 12 månader.

Man behöver inte avbryta medicinering när babyn får tänder, missfärgningar förorsakade av Niferex® går bort med tandborsten. Det löns inte heller att byta ut preparatet mot ett annat pga. magproblem eftersom andra preparat kan färga tänderna permanent.

Dosering

- 2kg 3 droppar x 1 = 4,5mg = 0,15ml
- 3kg 4 droppar x 1 = 6mg = 0,2ml
- 4kg 5 droppar x 1 = 7,5mg = 0,25ml
- 5kg 7 droppar x 1 = 10,5mg = 0,35ml
- 6kg 8 droppar x 1 = 12mg = 0,4ml
- yli 7kg 10 droppar x 1 = 15mg = 0,5ml

Österbottens välfärdsområde • www.osterbottensvalfard.fi • Växel 06 218 1111

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.