

ACTH-koe, miniannos (Pt-ACTH-Rm, 4938)

Tutkimuksella selvitetään lisämunuaisen kuorikerroksen hormonineritystoimintaa.

Valmistautuminen tutkimukseen

1. Ole syömättä ja juomatta edellisestä illasta kello 22:00 alkaen.
2. Voit juoda aamulla lasillisen vettä.

Useat lääkeaineet voivat vaikuttaa tutkimuksen tulokseen.

1. Kerro hoitavalle lääkärille, mitä lääkkeitä käytät; sekä jatkuvassa käytössä olevat lääkkeet, että sellaiset, joita käytät vain satunnaisesti. Hoitava lääkäri päättää ja antaa ohjeet lääkityksen mahdollisesta keskeyttämisestä testiä varten.

Tutkimuksen suoritus

1. Tutkimuksen alkaessa laskimoon asetetaan verisuonikanyyli.
2. Tutkimuksessa käytettävä testiaine (ACTH-hormoni) annetaan suoneen asetetun verisuonikanyylin kautta.
3. Tutkimuksessa tarvittavat verinäytteet otetaan verisuonikanyylin kautta.
4. Kun tarvittavat verinäytteet on otettu, kanyyli poistetaan.

Kokeen tekemiseen kuluu aikaa noin 1 1/2 tuntia.

Voit ottaa kokeen suoritukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Katselmoitu 25.8.2023 ALP