

## Atsatiopriini- ja Merkaptopuriini lääkkeen hoito-ohje

Atsatiopriini (Imurel®) ja merkaptopuriini (Merkaptopurin®) ovat solunsalpaajia, joka vaikuttavat tulehduksellisissa suolistosairauksissa ja autoimmuunimaksasairauksissa tulehdusreaktiota vaimentavasti. Lääkkeen teho alkaa yleensä 2-4 kuukauden kuluttua lääkityksen aloittamisesta.

### Ilmoita lääkärille

- mikäli käytät kihtilääkettä (Apurin®, Zyloric®, Allonol®), koska lääkeannos on tuolloin pienempi.
- mikäli olet raskaana, imetät tai suunnittelet raskautta. Nämä lääkkeet sopivat raskauden ja imetyksen aikana, mutta käyttö mietitään tapauskohtaisesti.

### Atsatiopriinin annostus

- Tavoiteannos on yleensä 2-3 mg/painokilo/vuorokaudessa.
- Lääkäri määrää jatkoannostelun laboratorikoetulosten perusteella. Tabletit otetaan runsaan nesteen kanssa 1-2 kertaa päivässä aterian yhteydessä.

### Merkaptopuriinin annostus

- Tavoiteannos on 1-1,5 mg/painokilo/vuorokaudessa.
- Lääkäri määrää jatkoannostelun laboratorikoetulosten perusteella.
- Tabletit otetaan runsaan nesteen kanssa kerran päivässä aterian yhteydessä.

### Sivuvaikutukset

- Hoidon alussa voi ilmetä pahoinvointia, ylävatsakipuja, kuumetta tai haimatulehdus.
- **Lopeta lääkitys ja ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai päivystykseen**, mikäli ilmaantuu vaikeita tulehdustauteja, kuumetta tai kovaa vatsakipua.
- Verenkuva ja maksa-arvoja seurataan säännöllisesti mahdollisen luuydinvaikutuksen tai maksaärsytyksen varalta.
- Pitkäaikaiskäytössä lääkkeet voivat lievästi lisätä imukudos- tai ihosyövän ilmaantumiseriskiä, mutta yleisesti katsotaan, että lääkkeen hyöty ylittää lääkityksestä aiheutuvan lisääntyneen riskin. Iho kannattaa suojata auringon UV-säteilyltä.

### Seurantakokeet

- Verikokeita otetaan 2, 4, 6 ja 8 viikon kuluttua hoidon aloituksesta tai annosmuutoksen jälkeen ja sen jälkeen säännöllisesti 3-4 kuukauden välein.
- Turvakokeet: verenk kuva, valkosolujen erittelylaskenta ja maksakokeet (ALAT, AFOS).