

## **CRH-koe (Pt-CRH-R, 3132)**

Tutkimuksella selvitetään aivolisäkkeen ja lisämunuaisen kuorikerroksen hormonieritystoimintaa tutkimuksessa käytettävän testiaineen (CRH) avulla.

### **Valmistautuminen tutkimukseen**

1. Ole syömättä ja juomatta edellisestä illasta kello 22:00 alkaen.
2. Voit juoda aamulla lasillisen vettä.

Useat lääkeaineet voivat vaikuttaa tutkimuksen tulokseen.

1. Kerro hoitavalle lääkärille, mitä lääkkeitä käytät; sekä jatkuvassa käytössä olevat lääkkeet että sellaiset, joita käytät vain satunnaisesti. Hoitava lääkäri päättää ja antaa ohjeet lääkityksen mahdollisesta keskeyttämisestä testiä varten.

### **Tutkimuksen suoritus**

1. Tutkimuksen alkaessa laskimoon asetetaan verisuonikanyyli.
2. Tutkimuksessa käytettävä testiaine (CRH) annetaan suoneen asetetun verisuonikanyylin kautta. CRH:n anto saattaa aiheuttaa ohimenevää kasvojen kuumotusta, pahoinvointia ja huimausta.
3. Tutkimuksessa tarvittavat verinäytteet otetaan verisuonikanyylin kautta.
4. Kun tarvittavat verinäytteet on otettu, kanyyli poistetaan.

Kokeen tekemiseen kuluu aikaa noin 2 1/2 tuntia.

Voit ottaa kokeen suoritukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan. Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Katselmoitu 25.8.2023 ALP