

Eteisväliseinän aukon (ASD, PFO) sulku

Sinulla on todettu sydämen eteisten väliseinässä aukko. Tämä aukko voidaan sulkea laskimoteitse ultraääniohjauksessa eteisväliseinän sulkulaitteella.

Ennen toimenpidettä

- Saat erilliset ohjeet mahdollisista lääketauoista, ravinnosta olostasi ja toimenpidettä edeltävistä tutkimuksista.
- Tarkista, että nivustaipeiden iho on terve.

Toimenpiteen aikana

Toimenpide suoritetaan nukutuksessa sydäntoimenpideyksikössä.

Sulkulaite viedään nivustaipeen laskimosta katetreja käyttäen sydämeesi. Sinut nukutetaan koska toimenpiteen ajan käytetään sydämenultraäänilaitteen ruokatorvianturia. Ultraäänien lisäksi sulkulaitteen paikalleen viennin apuna tarvitaan röntgensäteilyä ja joskus myös jodipitoista varjoainetta.

Toimenpide kestää noin tunnin. Vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia.

Toimenpiteen jälkeen

Olet valvontahoidossa ja vuodelevossa lääkärin ohjeen mukaan.

Nukutuksen ja ruokatorviultraäänien takia sinulla on jälkeinpäin kurkku kipeä. Nivusessa voi olla mustelmaa. Muita tuntemuksia ei pitäisi olla.

Kotiudut yleensä toimenpidettä seuraavana päivänä. Ennen kotiutumista sinulle tehdään sydämen ultraäänitutkimus rintakehän päältä ja saat yksilölliset jälkihoito-ohjeet lääkäriltä.

Eteisväliseinän sulkulaite ei ole este magneettikuvaukselle. Kuvausta ei kuitenkaan suositella tehtäväksi puoleen vuoteen toimenpiteen jälkeen.

Mikäli joudut kolmen kuukauden sisällä sulkulaitteen asetuksista hammaslääkəriin esimerkiksi hampaanpoistoon, on toimenpiteen yhteydessä otettava antibioottilääkitys.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön

- Jos sinulla on infektio tai kuumetta.
- Jos epäilet olevasi raskaana. Toimenpiteessä käytetään röntgensäteitä.

[Sydänsairaudet.fi](https://sydänsairaudet.fi) tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.