

Hampaiston hoito ennen leikkausta

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Hampaiston tulehduspesäkkeiden tiedetään aiheuttavan ajoittaista bakteerikylvöä verenkiertoon. Tulehduspesäkkeitä voi olla suun limakalvoilla, ikenissä, hampaistossa sekä leukaluussa, jopa hampaattomassa leukaluussa. Ennen leikkausta tulee suun ja hampaiston olla kunnossa. Tulehduspesäkkeet voivat olla myös piileviä siten, että ne voidaan havaita ainoastaan röntgenkuvauksella. Hammaslääkäri arvioi suun tilannetta tarkastaessaan myös röntgenkuvauksen tarpeen. Tarkastuksen tulee olla tehtynä enintään vuoden sisällä leikkauksesta.

Mahdollisten tulehduspesäkkeiden hoito tulisi suunnitella tehtäväksi hyvissä ajoin ennen leikkausta. Esimerkiksi hampaan poistokuopan paranemiselle olisi varattava tekonivelleikkausta edeltävästi vähintään neljä viikkoa.

Myös hampaiston kiinnityskudoksen terveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lentulehdus voi olla huomaamatta levinnyt laajalle hampaistossa ja sen kiinnityskudoksissa. Lentulehduksen oikeaoppinen hoito vaatii aikaa ja omaa aktiivisuutta. Tämän vuoksi hammaslääkäriin vastaanotolle tulee hakeutua hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Terve suu parantaa leikkauksen onnistumismahdollisuutta! Jatkuva säännöllinen hammashoidossa käynti on tärkeää myös leikkauksen jälkeen.

Lomake hammaslääkärinä varten (lääkäri täyttää)

Suorittamassani kliinisessä ja radiologisessa tutkimuksen perusteella totean, että

_____ hampaissa ja leuoissa ei ole viitteitä

leikkausta haittaaviin tulehduspesäkkeisiin. Myös limakalvot ovat terveet.

Paikka

Aika

Hammaslääkäri