

Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus

Sinulle tehdään hiippaläpän pallolaajennus.

Ennen toimenpidettä

- Saat erilliset ohjeet mahdollisista lääketauoista ja toimenpidettä edeltävistä tutkimuksista.
- Saat kutsun sairaalaan joko edellisenä päivänä tai toimenpidepäivän aamuna.
- Tarkista, ettei nivustaipeesi iholla ole ihottumaa tai punotusta.
- Ole syömättä ja juomatta 6 tuntia ennen toimenpidettä.

Toimenpiteen aikana

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja se kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia. Toimenpiteessä viedään niin sanottu holkki ja pallokatetri nivustaipeen laskimosta sydämeen.

Komplikaatiot ovat harvinaisia (1–2 %), mutta nivusen punktiopaikan vuodot ovat mahdollisia. Toimenpiteeseen liittyy myös pieni aivoverenkiertohäiriön riski (alle 1 %) sekä sydänpussivuodon riski (alle 1 %).

Toimenpiteen jälkeen

Olet vuodelevossa muutamia tunteja.

Nivuksessa voi olla mustelmaa. Muita tuntemuksia ei pitäisi olla.

Seuraavana päivänä sinulle tehdään ultraäänitutkimus. Kotiudut ja saat jälkihoito-ohjeet yksilöllisesti lääkärin ohjeen mukaan. Olet sairaalahoidossa noin kaksi vuorokautta.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön

- Jos sinulla on infektio tai kuumetta.
- Jos epäilet olevasi raskaana. Toimenpiteessä käytetään röntgensäteitä.

Sydänsairaudet.fi tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.