

Ihomuutosten hoito Imikimodi –voiteella (Aldara)

Ihomuutostenne hoidoksi on valittu Aldara –voide, jonka vaikuttava aine on imikimodi. Sitä käytetään ihon pienten tyvisolukasvaimien paikallishoitoon sekä aktiinkeratoosin hoitoon.

Käyttö

- Käytetään yleensä kolmena tai viitenä päivänä viikossa käyttöaiheesta riippuen. Käytä voidetta aina lääkärin ohjeen mukaisesti.
- Voide hierotaan ohuelti puhtaaseen ihoon ennen nukkumaanmenoa niin, että hoitokohde peittyy. Tyvisolusyövän hoidossa voidetta levitetään niin, että myös noin 1cm alue hoitokohteen ympäriltä peittyy.
- Voiteen annetaan vaikuttaa noin kahdeksan tuntia, jonka jälkeen se pestään pois. Hoitoaluetta ei saa kastella voiteen vaikutusaikana.
- Kädet pestään huolellisesti ennen annostelua ja sen jälkeen. Voidetta ei saa mennä silmiin, huulille, suuhun eikä sieraimiin.
- Hoidon kesto on keskimäärin 4 – 6 viikkoa.

Huomioitavaa

- Imikimodi aiheuttaa hoidettavalla alueella tulehdusreaktion. Tämä on ohimenevää, eikä ole vaarallista.
- Tulehdusreaktion oireita ovat hoidettavan ihoalueen kuumotus, punoitus, turvotus ja polttava tunne. Lisäksi voi esiintyä kutinaa, kipua, pinnallista haavautumista sekä rupeutumista.
- Hoidon aloituksen jälkeen tulehdusreaktio on voimakkaimmillaan noin kolmen viikon kuluttua. Reaktio lievittyy yleensä sen jälkeen hoidon edetessä.
- Mikäli tulehdusreaktio on epämiellyttävän voimakas, voit tauottaa voiteen ja olla yhteydessä TYKS Ihopoliklinikkaan.
- Ihon palamisen välttämiseksi hoidettava alue on suojattava auringolta vaatetuksen ja aurinkovoiteen avulla.

Säilytys

- Alle 25°C.
- Voide on annosteltu annospusseihin.
- Annospussin sisältöä ei saa käyttää uudelleen avaamisen jälkeen.