

Ihomuutosten hoito Imikimodi –voiteella (Zyclara)

Ihomuutostenne hoidoksi on valittu Zyclara –voide, jonka vaikuttava aine on imikimodi. Sitä käytetään kasvojen ja päänahan aktiinikeratoosin hoitoon.

Käyttö

- Käytetään yleensä päivittäin kahden viikon ajan, jonka jälkeen pidetään kahden viikon tauko. Käytä voidetta kuitenkin aina lääkärin ohjeen mukaisesti.
- Voide levitetään puhtaalle iholle ennen nukkumaanmenoa ja sen annetaan vaikuttaa noin kahdeksan tuntia. Tänä aikana aluetta ei saa kastella eikä peittää.
- Kädet pestään huolellisesti ennen annostelua ja sen jälkeen. Voidetta ei saa mennä silmiin, huulille, suuhun eikä sieraimiin.
- Voide pestään pois kahdeksan tunnin kuluttua.

Huomioitavaa

- Imikimodi aiheuttaa hoidettavalla alueella tulehdusreaktion. Tämä on ohimenevää, eikä ole vaarallista.
- Tulehdusreaktion oireita ovat hoidettavan ihoalueen kuumotus, punoitus, turvotus ja polttava tunne. Lisäksi voi esiintyä kesimistä, kutinaa, kipua, pinnallista haavautumista sekä rupeutumista.
- Mikäli tulehdusreaktio on epämiellyttävän voimakas, voit tauottaa voiteen ja olla yhteydessä TYKS Ihopoliklinikkaan.
- Ihon palamisen välttämiseksi hoidon aikana on suojauduttava auringolta vaatetuksen ja aurinkovoiteen avulla.

Säilytys

- Alle 25°C.
- Voide on annosteltu annospusseihin.
- Annospussin sisältöä ei saa käyttää uudelleen avaamisen jälkeen.