

Keuhkovaltimon varjoainekuvaus ja pallolaajennus

Sinulle on suunniteltu tehtäväksi keuhkovaltimoiden varjoainekuvaus ja tulosten perusteella myös pallolaajennushoito.

Ennen tutkimusta

- Ota lääkkeesi normaalisti, mikäli et ole saanut muita ohjeita.
- Saat erillisen ohjeen ravinnosta olostasi.

Tutkimuksen aikana

Tutkimus tehdään paikallispuudutuksessa nivuslaskimon kautta röntgenlöpivalaisussa. Tutkimus on paikallispuudutusta lukuun ottamatta kivuton. Tutkimus kestää noin kaksi tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Vointiasi seurataan sairaalassa seuraavaan päivään.

Tutkimuksen tulokset kuulet joko toimenpiteen jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana.

Toimenpide toistetaan yleensä muutaman kerran.

Tutkimuksen turvallisuus

Tutkimus ei ole täysin vaaraton, mutta vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia. Sairauteesi liittyen voi tulla yskää ja hengenahdistusta tutkimuksen aikana.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön

- Jos epäilet olevasi raskaana. Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.
- Lievä nuhaisuus ei estä tutkimusta, mutta kuume tai kova flunssa on este tutkimukselle.

Sydänsairaudet.fi tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.