

Klamydia

Klamydiatulehdus on yleisimpiä sukupuoliteitse tarttuvia tauteja, jonka aiheuttaa solunsisäinen bakteeri, Chlamydia trachomatis.

Oireet

- Klamydiatulehdus on naisilla useimmiten oireeton, myös moni mies sairastaa klamydiaa tietämättään. Jos oireita tulee, ne alkavat usein viikon tai parin sisällä tartunnasta. Oireet voivat myös alkaa paljon myöhemmin.
- **Naisen** klamydiatulehduksen oireina ovat lisääntynyt valkovuoto ja virtsankirvely sekä alavatsa- ja selkävivut.
- **Miehelle** tulee virtsankirvelyä, tihentynyttä virtsaamistarvetta sekä limaista tai märkäistä vuotoa.
- Hoitamaton klamydiatulehdus voi edetä lisäkivestulehdukseksi tai sisäsynnytintulehdukseksi, joka saattaa aiheuttaa lapsettomuutta tai kohdunulkoisen raskauden.
- Klamydia voi aiheuttaa myös silmätulehduksen ja jälkitautina niveltulehdusta. Vastasyntynyt voi saada synnytiskanavasta klamydiatartunnan, josta aiheutuu silmätulehdus tai keuhkokuume.

Toteaminen

- Klamydia todetaan seksitavoista riippuen kohdunkaulankanavasta, virtsanäytteestä, nielusta tai peräaukosta otettavalla näytteellä.

Hoito

- Klamydia hoidetaan suun kautta otettavilla antibiooteilla.
- Hoito on tartuntatautilain mukaan ilmaista yleisissä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.
- Kumppanin samanaikainen hoito on erittäin tärkeää. Klamydiaa sairastava on velvollinen ilmoittamaan taudista kumppaneilleen ja kehottamaan näitä hakeutumaan tutkimuksiin.
- Kondomia on käytettävä, kunnes jälkitarkastus on tehty.