

Lääkinnällinen hoitosukka toimenpiteen jälkeen

Suonikohjutaudin eli laskimovajaatoiminnan hoitoon tehtyjen toimenpiteiden jälkihoitoon kuuluu käyttää pitkää, reisipituista hoitosukkaa. Jos toimenpide tehdään molempiin jalkoihin, tarvitaan kaksi sukkaa. Hoitosukka laitetaan jalkaan heti toimenpiteen jälkeen eli sukan/sukkien pitää olla mukana tulessasi toimenpiteeseen.

Hoitosukan ostaminen

- Hoitosukka valitaan aina yksilöllisesti jalan mittojen mukaan.
- Ohjeet hoitosukan käyttöön saat toimenpiteen yhteydessä.
- Osta hoitosukat etukäteen tarkkojen mittausten jälkeen erikoisliikkeistä tai netistä. Hanki hoitosukka ajoissa, koska hoitosukkaa ei välttämättä löydy erikoisliikkeiden valikoimasta, jolloin ne täytyy tilata.
- Mikäli tilaat sukan netistä, pitää sinun osata tehdä mittaukset itse (ohjeet löytyvät sukkaa tilattaessa nettisivuilta).
- Sukan ostohinnasta ei saa kelakorvausta.

Hoitosukan kompressio- eli paineluokka

Hoitosukan paineluokka on yleensä 2.

Oikea jalka	Vasen jalka
Kompressioluokka (CL)	Kompressioluokka (CL)
__ I 18-21 mmHg	__ I 18-21 mmHg
__ II 23-32 mmHg	__ II 23-32 mmHg
__ III 34-46 mmHg	__ III 34-46 mmHg
__ IV 49+ mmHg	__ IV 49+ mmHg
Malli	Malli
__ Pohjepituus	__ Pohjepituus
__ Pitkä reisisukka	__ Pitkä reisisukka