

Lapsen luuydintutkimus

Tietoa luuydintutkimuksesta lapsipotilaan vanhemmille

Luuydintutkimuksen tarkoituksena on selvittää verisolujen muodostusta ja vieraiden solujen esiintymistä. Tutkimus tehdään, kun perusveren kuvan poikkeavuuksien yhteydessä epäillään veritautia. Luuydintutkimuksen avulla varmistetaan, että ydin tuottaa soluja normaalisti.

Valmistautuminen tutkimukseen

Ennen tutkimuksen tekemistä lapsi nukutetaan. Tämän vuoksi lapsen on oltava syömättä ja juomatta 4-6 tuntia ennen toimenpidettä. Toimenpide kestää yleensä noin 15 minuuttia, ja sen tekee lääkäri. Herääminen nukutuksesta vaihtelee potilaittain.

Tutkimuksen suoritus

Luuydinnäyte otetaan selän puolelta lantioluusta. Vastasyntyneiltä näyte voidaan ottaa sääriluun yläosasta.

Tutkimuksen jälkeen näytteenottoa kohti peitetään steriilillä suojalapulla ja pidetään kuivana 2-3 vuorokautta.

Näytteenottoa kohti saattaa aristaa jonkin verran toimenpiteen jälkeen. Lapselle voidaan antaa kipulääkettä ennaltaehkäisevästi sekä toimenpiteen jälkeen.

Vastausten saaminen

Luuydintutkimuksessa otetuista näytteistä tehdään useita erilaisia tutkimuksia. Osa niistä valmistuu useimmiten saman päivän aikana, mutta jotkut vaativat useita päiviä valmistuakseen. Hoitava lääkäri soittaa teille kotiin vastauksista sovittuna päivänä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voit olla yhteydessä lasta hoitavaan yksikköön.

Tervetuloa!