

SLT-laserhoito

Sinulle on varattu aika SLT (selektiivinen lasertrabekuloplastia) – toimenpidettä varten. SLT tehdään silmänpaineen alentamiseksi. Toimenpiteessä annetaan laservaloa iiriksen (värikalvon) ja sarveiskalvon väliseen ns. kammiokulmaan, jonka kautta silmänsisäinen neste suodattuu ja kulkeutuu. Toimenpiteen tarkoitus on parantaa silmänsisäistä nestekiertoa ja sitä kautta laskea silmänpainetta.

Laserhoito

Tullessasi silmään laitetaan toimenpidettä varten mustuaista supistava tippa. Se voi aiheuttaa päänsärkyä, jota voi hoitaa tavallisilla särkylääkkeillä kuten Panadolilla. Toimenpide kestää noin 10–20 minuuttia. Ennen toimenpiteen alkua laitetaan ensin silmään puudutustippa ja sen jälkeen silmän pintaa vasten asetetaan pieni linssi, jonka kautta laserhoito annetaan. Lääkäri ohjeistaa sinua toimenpiteen aikana erikseen siitä, mihin suuntaan täytyy katsoa. Toimenpiteen aikana laservalo välkkyy ja kuuluu napsahtelua. Kipua ei tunnu. Toimenpiteen jälkeen pääset kotiin.

Jälkihoito

Mitään jälkihoitoa ei tarvita, ja mahdolliset lääkitykset jatkuvat täysin ennallaan, myös silmänpainelääkkeet. Silmä voi toimenpidepäivän ajan tuntua ärtyneeltä. Mitään rajoituksia esim. rasituksen tai pesujen suhteen ei ole. Mikäli käyt muutenkin silmänpainetaudin hoidossa Tyksissä, tulee sinulle Tyksiin kontrollikäynti noin 3 kuukauden kuluttua. Muussa tapauksessa käyt kontrollissa sillä silmälääkärillä, joka sinut lähetti toimenpiteeseen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.