

Lihassaitiopaineen mittaus

Miksi tutkimus tehdään?

Tutkimuksella selvitämme, onko lihasta ympäröivän aition paine koholla. Liian korkea paine aitiossa heikentää lihaksen verenkiertoa. Tämä johtaa lihaksen hapenpuutteeseen, jolloin seurauksena on lihaskipu. Tutkimus tehdään joko säären tai pohkeen lihasaitiosta.

Miten valmistaudun tutkimukseen?

Tutkimusta varten ei tarvita erityisiä esivalmisteluita. Kireitä vaatteita ei suositella, jotta tutkittava lihas olisi helpompi riisua esille.

- Ota mukaan liikuntaan/kävelyyn sopivat kevyet housut (esimerkiksi verryttelyhousut) sekä lenkkikossu-tyyppiset jalkineet.
- Tutkittavan lihasaitioalueen kohdalta ihon tulee olla täysin terve.
- Tutkimusta ei tehdä, mikäli sinulla on tilapäisen tulehdussairauden (esimerkiksi flunssa) oireita.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimuksessa pyritään esimerkiksi juoksumattorasituksella provosoimaan alaraajaan sinulle tyypillinen kipu/oire. Kivun ilmaannuttua, molempien säärien/pohkeiden lihasaitioon viedään neulan avulla paineanturi, jolla mitataan lihasaitioiden sisäistä painetta yhtäaikaaisesti kummastakin jalasta. Paineen mittaus tapahtuu makuulla levossa ja kestää noin kuusi minuuttia. Ihoon jäävä pieni pistosjälki puhdistetaan ja suojataan steriilillä laastarilla, jonka saa poistaa iholta seuraavana päivänä.

Miten kauan tutkimus kestää?

Tutkimus kestää noin 1 – 1,5 tuntia.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Tutkimuspäivänä suositellaan välttämään suihkua/saunomista sekä kuormittavaa fyysistä rasitusta.

Mistä saan kuulla tutkimustuloksista?

Tutkimustuloksista kuulet sinua hoitavalta osastolta tai poliklinikalta.