

## **MK Magneettiohjattu neulanäyte/toimenpide**

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

### **Miten valmistaudut tutkimukseen?**

- Kun näyte otetaan pinnallisesta elimestä, esim. lihaksesta, ei tarvita esivalmisteluja.
- Jos sinulla on todettu puudutusaineallergia, ota yhteys lähettävään yksikköön.
- Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on hyvä jättää kotiin.

### **Miten tutkimus tehdään?**

Kuvaus tapahtuu valaistussa ja ilmastoidussa magneettikuvauslaitteessa, joka on avoin molemmista päistä. Tutkimuksen aikana on merkinanto- ja puheyhteys hoitajaan.

Tutkimuksen onnistuminen edellyttää paikallaan pysymistä. Tutkimusasento pyritään saamaan mahdollisimman mukavaksi.

Kuvauslaite pitää melko voimakasta ääntä kuvauksen aikana, siksi sinulla on kuulokkeet tai korvatulpat tutkimuksen ajan. Kuulosuojainten kautta saatetaan antaa tutkimuksen aikana hengitysohjeita. Hengityspidätykset kestävät kerrallaan noin 10–20 sekuntia. Musiikin kuuntelu on mahdollista useimmissa tutkimuksissa. Voit ottaa mukaan oman CD-levyn.

Neulanäytteen ottaa/toimenpiteen suorittaa radiologi hoitajien avustuksella. Toimenpiteen etenemistä seurataan nopeilla magneettikuvasarjoilla toimenpiteen aikana. Tutkimuksen aikana saatetaan myös antaa laskimoon tehosteainetta, joka ei sisällä jodia. Tällöin sinulle laitetaan suonihteys ennen tutkimusta. Tehosteaine poistuu elimistöstä virtsan mukana.

### **Mitä tutkimuksen jälkeen?**

Toimenpiteestä/hoidosta riippuen toimenpidelääkäri antaa sinulle tapauskohtaiset hoito-ohjeet.

Lähettävä yksikkö huolehtii tutkimustulosten kertomisesta.

### **Muuta huomioitavaa**

Toimenpiteestä riippuen aikaa kuluu 1-3 tuntia. Magneettiyksikössä kuvataan myös päivystyspotilaita, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia aikatauluun. Varaa reilusti aikaa käyntiä varten.

Tutkimuksella ei ole tiedossa olevia haittavaikutuksia. Tiedyt asiat vaativat kuitenkin niiden huomioimista kuvausta suunnitellessa. Ilmoitathan tutkimusyksikköön, jos sinulla on

sydämentahdistin, sisäkorvaproteesi, lääkeainepumppu, leikkausklipsi, metallisiruja tai sirpaleita kehossa.

Ehkäisykierukka ja sterilisaatioklipsit eivät yleensä ole este tutkimukselle. Glukoosimittarin sensori täytyy poistaa ennen kuvausta. Mainitse hoitajalle jos käytät lääkelaastaria.

Täytä oheinen esitietokaavake ja ota se mukaan tutkimukseen tullessa.

# Magneettitutkimuksen esitietokaavake

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Pituus (cm): \_\_\_\_\_ Paino (kg): \_\_\_\_\_

**Kyllä**      **Ei**

**Onko sinulle tehty leikkauksia?**

\_\_\_\_\_

Jos vastasit **kyllä**, niin mitä leikkauksia?

\_\_\_\_\_

**Onko sinulla kehossa jotain seuraavista?**

**Kyllä**      **Ei**

Sydämentahdistin tai -johdot

\_\_\_\_\_

Sydämen keinoläppä

\_\_\_\_\_

Hermostimulaattori ja/tai stimulaattorijohdot

\_\_\_\_\_

Välikorvaproteesi tai sisäkorvaistute

\_\_\_\_\_

Kuulolaite

\_\_\_\_\_

Shuntti

\_\_\_\_\_

Stenttejä/coileja/aneurysmaklipsejä

\_\_\_\_\_

Metallisirpaleita (esim. hitsauksesta, kranaatista)

\_\_\_\_\_

Infuusioportti ja/tai lääkeainepumppu

\_\_\_\_\_

Tekoniveliä/fiksaatoruuveja

\_\_\_\_\_

Hammasproteesi

\_\_\_\_\_

Tatuointeja/lävistyksiä

\_\_\_\_\_

Onko sinulla varjoaine- tai puuduteaineallergia?

\_\_\_\_\_

Onko sinulla munuaisten vajaatoimintaa?

\_\_\_\_\_

Oletko raskaana?

\_\_\_\_\_

Onko sinulle tehty sterilisaatio?

\_\_\_\_\_