

Mahalaukun tähystykseen tulevalle lapselle/nuorelle ja hänen vanhemmilleen

Mahalaukun tähystyksellä on mahdollista todeta ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen alkuosan eli pohjukaissuolen sairauksia ja niihin liittyviä kudosuutoksia.

Lääkäri tekee tutkimuksen lasten leikkaussalissa, ja anestesia lääkäri nukuttaa lapsen/nuoren tutkimuksen ajaksi. Ruokatorvi, mahalaukku ja pohjukaissuoli tutkitaan taipuisalla tähystimellä, joka viedään suun kautta mahalaukkuun. Yleensä limakalvolta otetaan pieniä koepaloja.

Valmistautuminen tutkimukseen

Ravinnotta ololla ehkäistään oksentaminen nukutuksen aikana. **Toimenpidettä ei voi tehdä, jos ravinnotta olo ei toteudu.**

- Toimenpideaamuna ei saa syödä. Äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta voi antaa neljä tuntia ennen sairaalaan tuloa.
- Vettä tai kirkasta mehua saa juoda noin desilitran tunti ennen sairaalaan tuloa.
- Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet lapsi voi ottaa aamulla kotona veden tai kirkkaan mehun kanssa (Nieltävää Pulmicort lääkitystä **ei saa** ottaa).
- Jos lapsi sairastuu tai tarvitsette lisätietoa tutkimuspäivästä, ota yhteys hoitavaan yksikköön.
- **Sairaalaan tuloaika soitetään / ilmoitetaan tekstiviestillä tutkimusta edeltävänä päivänä.**

Tutkimuksen jälkeen

Kun lapsi/nuori on toipunut nukutuksesta, saa hän jälleen syödä ja juoda. Otettujen koepalojen vuoksi lapsen/nuoren tulee tutkimuspäivänä välttää kuumaa ja karkeaa ruokaa sekä kuumia tai hiilihappopitoisia juomia. Tutkimuksen vuoksi lapsella/nuorella voi alkuun olla kurkkukipua, joka vaikeuttaa nielemistä. Kipua voidaan tarvittaessa helpottaa lääkkeillä.

Lääkäri kertoo alustavista tutkimustuloksista ennen kuin lapsi/nuori pääsee kotiin. Koepalojen tuloksista varataan lääkärin soitto- tai vastaanottoaika poliklinikalle noin kahden viikon päähän.

Lapsi kotiutuu toimenpiteen jälkeen voinnin mukaan. Kotimatkan ajaksi lapsella tulee olla saattaja, joka ei voi samanaikaisesti toimia autonkuljettajana.