

## Maksakasvaimen kemoembolisaatio (TACE-hoito)

Toimenpiteessä maksakasvaimen tai maksan etäpesäkkeeseen verenkierto estetään tukkimalla maksavaltimohaaroja nestemäisellä ja kiinteällä aineella. Toimenpide tehdään läpivalaisussa, joten siinä käytetään röntgensäteilyä ja jodivarjoainetta. Riittävän hoitotuloksen saavuttamiseksi tehdään usein toinen toimenpide 4-6 viikon kuluttua ja tarvittaessa useampikin toimenpide.

### Toimenpiteeseen valmistautuminen

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta kuusi tuntia ennen toimenpidettä.
- Lääkkeet voit ottaa toimenpideaamuna pienen vesimäärän kanssa, mutta älä ota nesteenpoistolääkkeitä ja tablettidiabeteslääkkeitä.

### Toimenpide

- Toimenpide kestää noin kolme tuntia valmisteluineen.
- Toimenpide ei ole kivulias.
- Katetri viedään nivusvaltimon kautta kasvainta suonittavaan maksavaltimon haaraan. Katetrin kautta ruiskutetaan solunsalpaajaa ja tukkivaa ainetta, kunnes kasvaimen verenkierto heikkenee. Hoitotulos tarkistetaan kuvauksella.
- Toimenpiteestä aiheutuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia. Yleensä ne liittyvät pistokohdan vuoto-ongelmiin tai erittäin harvinaiseen suonen vaurioitumiseen tai lääkeaineyleherkkyyteen.

### Toimenpiteen jälkeen

- Toimenpiteen sivuvaikutuksena saattaa esiintyä lämpöä, pahoinvointia, kipua tai tulehdusarvojen kohoamista, joihin saat oireenmukaista hoitoa.
- Vuodelevon kesto on pistokohdan sulkutavasta riippuen kahdesta tunnista yölospäin.
- Vointiasi seurataan ensin heräämössä ja sitten vuodeosastolla.
- Kotiin voit päästä toimenpidettä seuraavana päivänä, mikäli vointiasi on hyvä.
- Pistokohdan haavasidos tulee pitää kuivana vuorokauden.
- Raskaiden taakkojen nostelua, rajua liikuntaa ja saunomista tulee välttää viisi päivää.

### Ongelmien ilmaantuessa

- Ota yhteyttä terveyskeskukseen, hoitavaan yksikköön tai alueesi päivystykseen, jos sinulle tulee pistokohdan verenvuotoa, kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa.