

Hiippaläpän (mitraaliläpän) korjaus klipsillä, mitraclip

Sinulla on todettu sydämen hiippaläpässä vuoto. Tämä vuoto voidaan korjata valikoiduilla potilailla MitraClip®-laitteella.

Ennen toimenpidettä

- Saat erilliset ohjeet mahdollisista lääketauoista ja toimenpidettä edeltävistä tutkimuksista.
- Saavut sairaalaan joko edellisenä päivänä tai toimenpidepäivän aamuna.
- Tarkista, ettei nivustaipeen iholla ole ihottumaa tai punotusta.
- Ole syömättä ja juomatta 6 tuntia ennen toimenpidettä.

Toimenpiteen aikana

Toimenpide tehdään nukutuksessa ja se kestää kokonaisuudessaan noin 3 tuntia.

MitraClip®-sulkulaite viedään katetrilla nivustaipeen laskimosta sydämeen. Apuna käytetään ruokatorven kautta tehtävää ultraäänitutkimusta, röntgenlöpivalaisua ja jodipitoista varjoainetta.

Komplikaatiot ovat harvinaisia.

Toimenpiteen jälkeen

Olet valvontahoidossa lääkärin ohjeen mukaan. Valvonnasta siirryt takaisin vuodeosastolle. Olet vuodelevossa noin 6 tuntia.

Nukutuksen ja ruokatorviultraäänien takia sinulla on jälkeinpäin kurkku kipeä. Nivuksessa voi olla mustelmaa. Muita tuntemuksia ei pitäisi olla.

Toimenpidettä seuraavana päivänä sinulle tehdään ultraäänitutkimus. Kotiudut ja saat jälkihoito-ohjeet yksilöllisesti lääkärin ohjeen mukaan. Sairaalahoidossa olet noin 2 vuorokautta.

MitraClip®- sulkulaite ei ole este magneettikuvaukselle. Mikäli joudut kolmen kuukauden sisällä sulkulaitteen asetuksesta hammaslääkəriin, esimerkiksi hampaanpoistoon on toimenpiteen yhteydessä otettava antibioottilääkitys.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön

- Jos sinulla on infektio tai kuumetta.
- Jos epäilet olevasi raskaana. Toimenpiteessä käytetään röntgensäteitä.

Sydänsairaudet.fi tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.