

Asitreiini (Neotigason®)

Neotigasonin® vaikuttava aine asitreiini on A-vitamiinijohdannainen ja se kuuluu retinoidien lääkeaineryhmään. Asitreiini hidastaa hilsetystaudeille ominaista ihosolujen nopeaa uudistumista ja sarveistumista.

Käyttö

- Hoidon tulokset eivät näy välittömästi. Aloitusvaiheessa saattaa ilmetä akuuttia taudin pahenemista, mikä yleensä rauhoittuu 2-3 viikon kuluessa.
- Tavallinen annos on 25 – 50 mg kerran päivässä, mutta matalampiakin annoksia voidaan käyttää. Annostus ei yleensä ylitä 75 mg.
- Annostusta saatetaan muuttaa hoidon edetessä ja se sovitetaan mm. oireiden vaikeuden ja potilaan yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Hoitojakson pituus määräytyy hoitotuloksen ja mahdollisten haittavaikutusten mukaan. **Käytä lääkettä aina lääkärin ohjeen mukaisesti.**

Ottotapa

- Kapselit otetaan runsaan nesteen kera kerran päivässä ruokailun yhteydessä tai maidon kanssa.
- Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee aloittaa lääkitys normaalien kuukautisten toisena tai kolmantena päivänä.
- Haittavaikutusten ilmaantuminen riippuu yleensä annoksesta ja voimakkuus vaihtelee yksilöllisesti. Kerro hoitavalle lääkäriillesi, mikäli haittavaikutukset ovat hankalia.

Raskaus ja imetys

- Neotigason® **vahingoittaa vakavasti sikiötä**. Et saa olla raskaana tai tulla raskaaksi hoidon aikana tai kolmeen vuoteen hoidon päättymisen jälkeen.
- **Tehokas raskaudenehkäisy on oltava käytössä koko hoidon ajan**. Ehkäisy on oltava käytössä vähintään neljä viikkoa ennen hoidon aloittamista ja sitä on jatkettava kolmen vuoden ajan hoidon päättymisen jälkeen.
- Retinoidin pitoisuus Neotigason® -valmistetta käyttävien miesten siemennesteessä on niin matala, ettei se vahingoita sikiötä.
- Lääkityksen aikana ei saa imettää.

Haittavaikutukset

- Limakalvojen, ihon ja silmien kuivuminen sekä nenän limakalvojen kuivumisesta johtuvat nenäverenvuodot.
- Suun kuivuminen ja janon tunne.
- Huulten halkeilu.
- Hämäränäön heikentyminen.
- Maksa- ja rasva-arvojen nousu.
- Lihas- ja nivelkivut.
- Päänsärky.
- Mielialan muutokset, muun muassa masentuneisuus.
- Lisääntynyt hiustenlähtö, kynsien haurastuminen ja kynsivallien tulehdus.

Seuranta

- Maksa-arvoja ja rasva-arvoja seurataan säännöllisillä verikokeilla ennen hoidon aloittamista ja sen aikana.
- Raskaustestin on oltava negatiivinen ennen hoidon aloitusta sekä sen loputtua. Tarvittaessa raskaustesti tarkistetaan kuukausittain.
- **Verikokeilla käyminen on edellytys reseptin uusinnalle.**

Huomioitavaa

- **Verta ei saa luovuttaa** hoidon aikana eikä kahteen vuoteen hoidon päättymisen jälkeen.
- Lääke **herkistää auringonvalolle**, joten vältä liiallista auringossa oleskelua. Mahdollisen altistuksen yhteydessä suositellaan käyttämään aurinkosuojavoidetta.
- Käytä kosteuttavia emulsiovoiteita ja huulivoiteita. Vältä ihoa kuorivien aineiden käyttöä ja ihokarvojen poistoa vahalla.
- **Älä koskaan anna tätä lääkettä kenenkään muun käyttöön.** Se voi vahingoittaa raskaana olevien naisten syntymättömiä lapsia tai aiheuttaa käyttäjälleen vakavia terveysongelmia. Ylijääneet lääkkeet viedään apteekkiin hävitettäväksi.
- **Alkoholi** lisää haittavaikutusten ilmaantumisen vaaraa.

Neotigason® ja muut lääkkeet

- Vain progesteronia sisältäviä ehkäisyvalmisteita eli ”minipillereitä” ei suositella käytettäväksi raskauden ehkäisyyn Neotigason® –hoidon aikana, sillä Neotigason® voi heikentää niiden tehoa.
- A-vitamiinia sisältäviä valmisteita, muita retinoideja, metotreksaattia ja tetrasykliinejä on vältettävä Neotigason® –hoidon aikana.
- Neotigason® saattaa muuttaa fenytoiinin (epilepsialääke) vaikutusta.