

Peräsuolen varjoainekuvaus

Peräsuolen varjoainetutkimuksella eli defekografialla voidaan aikuispotilailla selvittää peräsuolen toimintaa ja lantion pohjan mahdollista laskeutumista ulostamisen yhteydessä.

Tutkimus tehdään, kun potilaalla on vaikeuksia ulostamisessa, tunne peräsuolen huonosta tyhjenemisestä tai peräsuolen esiinluiskahdus. Peräsuolen varjoainekuvaus ei sovellu raskaana oleville.

Miten valmistaudut tutkimukseen?

- Esivalmisteluja ei ole.
- Saat syödä normaalisti.
- Tutkimuspäivän aamuna peräruiskeiden ja ulostuslääkkeiden käyttö on kielletty.

Miten tutkimus tehdään?

1,5 tuntia ennen varsinaisen tutkimuksen alkua saat juotavaksi 700 millilitraa varjoainetta ohutsuolen loppupään kuvantamiseksi. Varjoaineella ei ole haittavaikutuksia. Itse tutkimuksessa laitetaan lisäksi 250 millilitraa paksumpaa varjoainetta peräaukon kautta peräsuoleen.

Tutkimuksen alussa makaat vasemmalla kyljellä kuvaustelineessä. Myöhemmin teline nostetaan pystyyn ja istut ämpärille. Kuvia otetaan levossa, ponnistaessa ja ulostaessa.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia, mutta varaa aikaa kaiken kaikkiaan 2 tuntia.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Kun tutkimus on valmis, voit lähteä röntgenosastolta. Saat syödä, juoda ja käydä WC:ssä normaaliin tapaan. Runsasta juomista suositellaan, jotta varjoaine kulkeutuisi nopeammin pois suolistosta. Tuloksista kuulet lähettävältä lääkäriltä.