

## Rinta-aortan pullistuman suonensisäinen korjaus (aortan stenttaus TEVAR)

Sinulla on todettu rinta-aortan pullistuma, joka laajentuessaan saattaa pahimmillaan aiheuttaa repeämävaaran. Hoitokeinoksi on valittu aortan stenttaus, jossa sairas verisuonen kohta tuetaan sisältäpäin verkkoputkella.

### Ennen sairaalaan tuloa


- Tarkista, että kainaloiden ja nivustaipeiden iho on terve.
- Saat erillisen ohjeen lääkityksistä kutsukirjeessä.
- Ota yhteyttä sydänosasto 2 (puhelin 02 313 7950) arkisin kello 8–15, mikäli sinulla on pienintäkin epäselvyyttä lääkityksen tauotuksen suhteen.

### Ennen toimenpidettä

- Sinulta otetaan verikokeita ja tarvittaessa keuhkokuva.
- Edeltävänä iltana käyt suihkussa.
- Toimenpidettä edeltävästä yöstä alkaen olet ravinnotta.
- Ihokarvat ajellaan nivustaipeista, vasemmasta kainalosta ja rintakehältä toimenpideaamuna.

### Toimenpiteen aikana

Toimenpide tehdään nukutuksessa leikkausosastolla. Sinulle laitetaan nestetiputus ja virtsakatetri. Molempiin nivustaipeisiin ja vasempaan kainaloon tehdään pienet haavat. Näiden kautta verisuonta tukeva verkkoputki ohjataan paikoilleen.



## Toimenpiteen jälkeen

Vointiasi seurataan alkuun heräämössä, mistä siirryt vuodeosastolle.

Toimenpiteen jälkeen sinulle saattaa tulla kuumetta, mikä on vierasesineen aiheuttama luonnollinen reaktio.

Haavojen ympäristöön tulee tavallisesti mustelmaa, joka on vaaratonta.

Sairaalassa olet seurannassa muutamia päiviä toipumisestasi riippuen.

Kotiutus ja jälkihoito tapahtuvat lääkärin ohjeen mukaan.

[Sydänsairaudet.fi](http://Sydänsairaudet.fi) tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • [www.vsshp.fi](http://www.vsshp.fi) • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.