

Selkäydinkanavan varjoainetutkimus eli myelografia

Olette tulossa tietokonetomografiaohjattuun myelografiaan.

Miten valmistaudutte tutkimukseen?

- Teille on varattu paikka vuodeosastolle, koska tarvitsette lepoa ja jälkitarkkailua tutkimuksen jälkeen.
- Tutkimuspäivänä tulee olla syömättä ja juomatta.
- Ennen tutkimusta tulee pitää tauko tiettyjen lääkkeiden, esimerkiksi Marevanin käytössä. Osasto antaa tarkemmat ohjeet lääkkeiden tauolle jättämisessä.
- Ennen tutkimusta tutkitaan veren P-INR, trombosyytit ja hemoglobiini. Saat osastolta ohjeet verinäytteiden ottamiseksi.
- Korut ja kello jätettävä pois tutkimukseen tultaessa.

Mikäli olette tai epäilette olevanne raskaana, pyydämme ilmoittamaan asiasta tutkimukseen lähettävälle yksikölle.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimuspöydällä tulee olla liikkumatta koko toimenpiteen ajan. Tutkimusasento pyritään järjestämään mahdollisimman mukavaksi.

Ihon pesun ja puuduttamisen jälkeen toimenpidelääkäri ruiskuttaa varjoainetta selkäydinkanavaan. Varjoaineen laittamisen jälkeen asentoanne vaihdellaan röntgenhoitajan ohjeiden mukaan, jotta varjoaine kulkeutuu halutulle alueelle. Tämän jälkeen tehdään tietokonetomografiakuvaus, jossa otetaan leikekuvia selkärangan alueelta.

Kuinka kauan tutkimus kestää?

Tutkimus kestää 30-60 minuuttia.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Tutkimuksen jälkeen teidät kuljetetaan makuuasennossa vuodeosastolle jälkitarkkailua varten. Teidän tulee olla vuodelevossa 6 tuntia, mutta saatte kuitenkin syödä ja juoda vuoteessa pääpuoli kohotettuna.

Mistä kuulette tutkimustuloksista?

Lähetävä yksikkö huolehtii tutkimustuloksista sekä mahdollisista jatkotoimista.