

## Sydänlihaskoepalan otto

Sydänlihaksen tilaa tutkitaan koepalan avulla. Koepala otetaan sydänlihaskoepalan ja sydänlihastulehduksen syyn selvittämiseksi, solusalpaajahoidon sydänvaikutusten seuraamiseksi tai sydänsiirtopotilaan seurannassa hylkimisreaktion toteamiseksi.

### Ennen toimenpidettä

- Ota lääkkeesi normaalisti.
- Ole syömättä ja juomatta kutsukirjeen ohjeen mukaan.

### Toimenpiteen aikana

Koepala otetaan paikallispuudutuksessa. Koepalapihti viedään röntgenlöpivalaisussa joko kaulalta tai nivustaipeesta laskimoa pitkin sydämen oikeaan kammioon, josta otetaan muutama koepala.

Toimenpide kestää noin puoli tuntia ja on puudutusta lukuun ottamatta kivuton.

### Toimenpiteen jälkeen

- Vointiasi seurataan sairaalassa muutama tunti.
- Ennen kotiutumista kardiologi tekee sinulle sydämen ultraäänitutkimuksen.
- Vastauksen koepalasta saat joko puhelimitse tai sovitun poliklinikkakäynnin yhteydessä.

### Toimenpiteen turvallisuus

Toimenpide ei ole täysin vaaraton, mutta vakavat komplikaatiot, kuten veren vuotaminen sydänpussiin, ovat harvinaisia.

### Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön

- Jos epäilet olevasi raskaana. Toimenpiteessä käytetään röntgensäteitä.
- Lievä nuhaisuus ei estä tutkimusta, mutta kuume tai kova flunssa on este koepalan otolle.

[Sydänsairaudet.fi](http://Sydänsairaudet.fi) tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • [www.vsshp.fi](http://www.vsshp.fi) • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.