

Nukutuksessa tehtävä tutkimus tai toimenpide

Lapsenne on tulossa nukutusta vaativaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen.

Valmistautuminen tutkimukseen

Lapsen on nukutuksen vuoksi oltava ravinnotta ennen tutkimusta. Ravinnotta ololla ehkäistään oksentaminen nukutuksen aikana. **Tutkimusta ei voi tehdä nukutuksessa, jos ravinnotta olo ei toteudu.**

- Toimenpideaamuna **ei saa syödä**. Äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta voi antaa neljä tuntia ennen sairaalaan tuloa.
- Kotona saa juoda vettä tai kirkasta mehua enintään 2dl kunnes sairaalaan saapumiseen on aikaa 1 tunti.
- Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet lapsi voi ottaa aamulla kotona veden tai kirkkaan mehun kanssa.
- Monivitamiini- ja hivenainevalmisteita ei saa ottaa tutkimuspäivän aamuna, jos se ei ole välttämätöntä.
- Jos lapsi sairastuu tai tarvitsette lisätietoa tutkimuspäivästä, ota yhteys hoidosta vastaavaan yksikköön.
- **Sairaalaan tuloaika ilmoitetaan tekstiviestillä/puhelimitse tutkimusta edeltävänä päivänä.**

Tutkimuspäivänä sairaalassa

- Osastolla lapselle laitetaan puudutusvoide kanylointia varten.
- Vanhemmilla on mahdollisuus seurata lasta tutkimus- tai toimenpideosastolle ja olla hänen vierellään siihen asti, kunnes hänet nukutetaan.

Tutkimuksen jälkeen

Heräämisen jälkeen lapsi saa ensin juoda ja sitten syödä vointinsa mukaan. Tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen lapsi saa välipalan osastolla.

Lapsi kotiutuu tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen voinnin mukaan. Kotimatkan ajaksi lapsella tulee olla saattaja, joka ei voi samanaikaisesti toimia autonkuljettajana.