

Valmistautuminen ihokirurgiseen toimenpiteeseen

- Ihokirurginen toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa.
- Ennen toimenpidettä saat syödä ja juoda normaalisti.
- Ennen poliklinikalle tuloa on suositeltavaa käydä suihkussa ja pestä myös hiukset.
- Mikäli leikkaus kohdistuu kasvojen alueelle, tule ilman meikkiä ja koruja.
- Jos käytät asetosalisylihappovalmisteita (Aspirin, Disperin, Primaspan), pyydämme lopettamaan lääkkeen käytön viisi päivää ennen toimenpidettä.
- Asetosalisylihappovalmisteiden käytössä ei tule pitää taukoa, jos sinulle on aiemmin asennettu (lääke)verkkoputki sepelvatimoiden toimenpiteen yhteydessä.
- Lääkkeen voi aloittaa uudelleen toimenpidettä seuraavana päivänä.
- Jos käytät verta ohentavaa lääkitystä (esim. Marevan), pyydämme sinua ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriisi ja neuvottelemaan mahdollisuudesta tarvittaessa pienentää verta ohentavan lääkityksen annosta.
- Haava-alueen verenvuodon välttämiseksi Marevan-lääkityksen seuranta-arvon tulisi olla alle kaksi ennen toimenpidettä.

Toimenpiteen jälkeen

- Toimenpiteen jälkeen pääset lähtemään heti, ellei ennalta ole toisin sovittu.