

Vatsavaltimon pullistuman suonensisäinen korjaus

Vatsavaltimon pullistuma on usein oireeton ja löytyy sattumalta muiden tutkimusten yhteydessä. Kyse on valtimon seinämän heikkoudesta, johon vaikuttavat mm. valtimokovettumatauti, perinnölliset tekijät, harvinaiset sidekudossairaudet ja suonien seinämän krooninen tulehdustila. Leikkaus tehdään suonensisäisesti käyttämällä suonensisäistä verisuoniproteesia.

Ennen leikkausta

- Leikkausta edeltävänä päivänä kello 24 jälkeen et saa syödä tai juoda.
- On suositeltavaa juoda edellisenä päivänä vettä noin 1,5 litraa.
- Peseydy hyvin leikkausta edeltävänä iltana, erityisesti leikkausalue, nivuset ja napa.

Leikkaus

Leikkaus tehdään nukutuksessa tai puudutuksessa. Leikkauksessa suonensisäinen verisuoniproteesi viedään sairaan valtimon sisään, jolloin verenkierrolle muodostuu uusi reitti.

Leikkauksen jälkeen

- Suihkussa saa käydä leikkauksen jälkeisenä päivänä. Saunominen on kielletty 2 viikkoa.
- Kuntoutumisen kannalta on tärkeää nousta liikkeelle mahdollisimman pian
- Kuukauden ajan tulee välttää ponnisteluja ja sen jälkeen saa palata aiempaan liikuntaharrastukseen.
- Haavakipuun voi ottaa lääkkeeksi esimerkiksi parasetamol.
- Kotiutuminen tapahtuu yleensä kolmantena päivänä. Sairausloman pituus on 4 viikkoa.
- Veren hyytymis- ja kolesterolilääke aloitetaan pysyvästi.
- Tupakointi on kielletty pysyvän hoitotuloksen saamiseksi. Nikotiinikorvausvalmisteita voi tarvittaessa käyttää.
- Jälkitarkastus (käynti- tai soittoaika ja tietokonetomografiakuvaus) ovat 1 kuukauden kuluttua ja sen jälkeen vuosittain.
- Haavan hoidosta ja ompeleiden poistosta annetaan erillinen ohje.
- Mikäli sinulla on seuraavan 6 kuukauden aikana suun ja nielun toimenpide, keuhkoputkien tähytys tai jokin muu tulehdus, niin muista aina mainita tästä leikkauksesta lääkärille, jotta antibiootti voidaan aloittaa suojaksi.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai päivystykseen

- Mikäli raaja tulee kipeäksi, lihasten toiminta ja tunto raajassa heikkenee asteittain, voi kyseessä olla veritulppa, jolloin tilanne on vakava.

- Mikäli haavalle tulee punoitusta, turvotusta ja kipua tai sinulle nousee kuume.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.