

Virtsarakon botuliinitoksiinihoito

Virtsarakon yliaktiivisuuden ja sulkijalihaskouristuksen hoitoon käytetään botuliinitoksiinia. Toimenpiteessä ruiskutetaan botuliinitoksiinia useampaan kohtaan sulkija- ja rakkolihaksen alle. Virtsankarkailu vähentyy muutaman viikon sisällä pistoksista ja vaikutusaika kestää yksilöllisesti 2-9 kuukautta.

Toimenpidettä ennen

Tutkimusta ei tehdä virtsatietulehduksen aikana. **Sinun tulee antaa virtsanäyte 1–2 viikkoa ennen varattua aikaa.** Toimita virtsanäyte oman terveyskeskuksen laboratorioon, josta voit myös hakea tarvittavat näytteenottovälineet kotiin.

- suorita kotona huolellinen alapesu ennen toimenpiteeseen tuloa
- Veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkitystä ei tarvitse tauottaa ennen poliklinista toimenpidettä, ota kotilääkkeet normaalisti toimenpidepäivänä

Toimenpide

Toimenpide tehdään poliklinikalla virtsatietähystyksen yhteydessä. Toimenpide kestää noin 30 minuuttia ja tehdään paikallispuudutuksessa. Toimenpiteen jälkeen pääset heti kotiin.

Toimenpiteen jälkeen

Saattaa esiintyä verivirtsaisuutta ja lievää rakkokipua, mutta oireet helpottavat melko nopeasti. Ensimmäisen vuorokauden ajan on syytä juoda normaalia enemmän ja virtsata usein. Kipuun voit tarvittaessa ottaa särkylääkettä. Mikäli et saa kunnolla virtsattua, ota yhteys sinua hoitaneeseen yksikköön tai päivystykseen.

Jatkohoito

Jatkohoito ja mahdollinen jälkikontrolli määrätään sinulle yksilöllisesti hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.