

Ögats regnbågshinneinflammation (irit), läkemedelsbehandling

VECKA 1

Kortisondroppe (t.ex. Dexa® eller Pred Forte®) 1-2 droppar med 1 timmes mellanrum i det sjuka ögat, (inte på natten).

Pupillutvidgande droppe (t.ex. Scopolamin® eller Tropicamid®) 1 droppe 3 gånger i dygnet. OBS: denna droppe försämrar närsynen ännu 3-4 dagar efter avslutad behandling.

Håll en paus på 5 minuter mellan dropparna.

Kortisonsalva till natten. Ca 0,5-1 cm salva innanför nedre ögonlocket.

VECKA 2

Kortisondroppe 1 droppe varannan timme.

Pupillutvidgande droppe 1 droppe 3 gånger i dygnet.

Kortisonsalva till natten. Ca 0,5-1 cm salva innanför nedre ögonlocket.

VECKA 3

Kortisondroppe 1 droppe 4 gånger i dygnet.

Pupillutvidgande droppe används inte mer.

Kortisonsalva till natten. Ca 0,5-1 cm salva innanför nedre ögonlocket.

VECKA 4

Kortisondroppe 1 droppe 3 gånger i dygnet.

Kortisonsalva till natten. Ca 0,5-1 cm salva innanför nedre ögonlocket.

VECKA 5

Kortisondroppe

1 droppe 2 gånger i dygnet.

VECKA 6

Kortisondroppe

1 droppe 1 gång i dygnet.

Du kan besöka privat ögonläkare för kontroll ca 8 veckor efter påbörjad medicinering, om inga andra anvisningar givits.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.