

ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurar

ACTH-testet undersöker binjurarnas funktion på ert barn. Barnet ges en dos testämne intravenöst enligt patientens storlek. Ämnet tvingar binjurebarken att avge kortisolhormon vars koncentration mäts med blodprov en gång före och två gånger efter testet.

För testet sätts en provtagningskanyl i barnets ena arm. Via kanylen tas alla nödvändiga prov, smärtfritt. Testämnet injiceras också via kanylen i form av en snabb injektion.

Anvisningar för undersökningen

- Införandet av kanylen känns som ett knip. Injektionsområdet kan bedövas i förväg **med bedövningsplåster** (Emla/Tapin), plåstren kan placeras i armvecket och på handryggen redan hemma **ca en timme före undersökningen**. Obs! För barn under 1 år gamla rekommenderas inte bedövningsplåster. Bedövningsplåster kan köpas från apotek utan recept.
- Före undersökningen, från och med föregående kväll klockan 22 får man varken äta eller dricka. Vatten kan drickas rimligt (1-2 dl).
- Ifall patienten har **hydrokortisonmedicinering**, bör man **avstå från den** kvällen och morgonen före undersökningen.
- Många läkemedel stör testresultaten. Ifall patienten har en regelbunden medicinering var god och ta kontakt för att utreda medicineringens påverkan på testet.
- Ifall barnet är sjukt (feber, svår influensa) vänligen kontakta numret nedan för att komma överens om en ny undersökningstid.
- Efter undersökningen får barnet en måltid på avdelningen. Ifall ert barn har matallergier var goda och meddela om dem i förväg till telefonnumret nedan.
- Reservera cirka 3 timmar för undersökningen.
- Ifall ni har frågor gällande undersökningen kontakta numret nedanför.

Ta kontakt

Dagsjukhuset för barn och unga MM2

- Telefon 02 313 1412
- Telefontider måndag-fredag klockan 13-15