

## Abiraterone acetate -patientanvisning

Läkaren har ordinerat läkemedlet abiraterone acetate. Medicinen används hos män för att vårda prostatacancer som spridits. Medicinen förhindrar kroppen att bilda testosteron, vilket kan minska framskridningen av prostatacancer.

Dessutom ordinerar läkaren antingen Prednison eller Prednisolon medicinen. Dess syfte är att sänka högt blodtryck, minska vätska att ansamlas i kroppen och/eller förhindra för låga kalium halter i kroppen.

Prostatacancervården med hormon-injektioner fortsätter vid sidan av abiraterone acetate - medicinen.

### Dosering

- Medicinen tas via munnen.
- Den rekommenderade dygnsdosen är 1000 mg (två 500 mg:s tabletter eller en 1000 mg tablett) som engångsdos tillsammans med prednison eller prednisolon 10 mg i dygnet.
- Ta medicinerna på tom mage eller två timmar efter måltid.
- Du får äta en timme efter medicinintaget.
- Ta medicinen så fort som möjligt ifall du har glömt att ta medicinen normal tid. Ifall den dagliga doseringen blir helt otagen skall vården fortsätta enligt den normala doseringstidtabellen följande dag.

### Möjliga biverkningar

- Svullnad i extremiteterna, hypokalemi, högt blodtryck, urinvägsinfektion, dysfunktion i hjärtat, dysfunktion i levern, benbrott och lungirritation, benskörhet.
- Berätta om möjliga biverkningar åt läkaren, sjukskötaren eller apotekspersonalen.

### **Diskutera med din läkare ifall du lider av leversvikt, diabetes eller hjärtsvikt innan påbörjandet av medicinen.**

Efter påbörjandet av vården uppföljs blodvärden tätt, du får skilda anvisningar för uppföljningen. Dessutom skall blodtrycket, vikten och möjliga svullnader följas upp 2 x i veckan.

Läkaren skriver ett B-utlåtande som skickas till FPA. Du får ersättningsbeslutet ungefär inom en vecka. Efter det kan du köpa medicinen på apoteket och påbörja användningen. Informera den urologiska poliklinikens skötare ifall medicinens påbörjan av någon anledning fördröjs.