

Angio-seal (kollagenpropp)

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Patientens namn: _____

Angio-Seal placerings dag: _____

Angio-Seal placerings plats: _____

Instruktioner för patienten

Kontrastavbildningen av artären har gjorts via artären i ljumsknen. Ljumskartären har stängts med Angio-Seal stängningsanordning för att förhindra blödning. Kollagenproppen upplöses av sig själv inom 90 dagar efter placeringen.

Om det uppkommer blödning, svullnad eller om det uppstår ett stort kraftigt blåmärke runt punktions område eller om du märker infektions symptom hos dig själv till exempel feber, kontakta avdelningen för hjärtåtgärder eller juren.

Håll guiden med dig de tre följande månaderna och visa den till läkaren eller sjukskötaren, om du hamnar på sjukhus.

Information till den behandlande läkaren

Ljumskartären till ägaren av denna guide har stängts med Angio-Seal stängningsanordning. Stängningsanordningen innehåller upplösningsbara delar; ett ankare belägen på insidan av ådern och en liten kollagenfyllning på utsidan av ådern.

Åtgärder riktade mot/på ljumskartären rekommenderas i första hand göras kontralateralt i 3 månader från placeringsdatumet.