

## Azatioprin och Merkaptopurin läkemedels behandling

Azatioprin (Imurel®) och merkaptopurin (Merkaptopurin®) är cytostatika som inverkar inflammationshämmande vid inflammatoriska tarmsjukdomar och autoimmuna leversjukdomar. Effekten börjar vanligtvis 2-4 månader efter att medicinen har påbörjats.

### Informera läkaren

- ifall du använder läkemedel mot gikt, eftersom dosen är mindre i sådana fall.
- ifall du är gravid, ammar eller planerar graviditet. Dessa läkemedel passar under graviditet och amning, men användningen bedöms individuellt.

### Azatioprin dosering

- Måldosen är vanligen 2-3 mg/kg kroppsvikt/dygn.
- Läkaren ordinerar den fortsatta doseringen enligt laborietestresultaten.
- Tabletterna tas med riklig vätska 1-2 gånger om dagen i samband med måltid.

### Merkaptopurin dosering

- Måldosen är 1-1,5 mg/kg kroppsvikt/dygn.
- Läkaren ordinerar den fortsatta doseringen enligt laborietestresultaten.
- Tabletterna intas med riklig vätska 1-2 gånger om dagen i samband med måltid.

### Bieffekter

- I början av behandlingen kan det förekomma illamående, smärta i övre delen av buken, feber eller inflammation i bukspottkörteln.
- Avsluta medicineringen och kontakta den vårdande enheten eller jouren ifall det uppkommer svåra inflammationssjukdomar, feber eller hård smärta i buken.
- Blodbilden och levervärdena följs regelbundet upp för möjliga bieffekter såsom benmärgshämning eller leverirritation.
- Under långtidsbehandling kan läkemedlen lindrigt öka incidensen på cancer i lymfatiska systemet eller huden, men i allmänhet betraktas att nyttan av medicinen överskrider den tilltagande risken. Det lönar sig att skydda huden mot solens UV-strålning.

### Uppföljningsprov

- Det tas blodprov 2, 4, 6 och 8 veckor efter påbörjad behandling eller efter dosjustering och därefter regelbundet med 3-4 månaders mellanrum.
- Säkerhetsprov: blodbild, differentialräkning av leukocyter samt levervärden (ALAT, AFOS).