

Behandling av hemorrojder med hjälp av gummiband (barron)

Åtgärden

I samband med undersökningen vårdas inre hemorrojder så att de snörs åt med hjälp av spänt gummiband (latexfritt).

Efter åtgärden

Efter gummibands appliceringen kan det uppträda en lindrig smärta eller fyllnadskänsla, detta kan kännas i ett par dagar efter åtgärden. Några dagar efter åtgärden kan det förekomma blödning och då kan det behövas förband eller binda. Gummibandet förhindrar hemorrojdens blodcirkulation och därför skrupnar hemorrojden och faller av efter 1-2 veckor. Då kan det förekomma mer blödning än vanligt.

Hemvårdsinstruktioner

Vid behov kan du ta smärtstillande medicin. Ibland kan det hjälpa att duscha ändtarmsöppningen. Det är bra att dricka tillräckligt och äta fiberrik mat så att tarmens innehåll hålls mjuk. Att vistas ute, lätt motion och hälsosam mat främjar återhämtningen.

Efterkontroll

Vanligtvis behövs ingen efterkontroll. Vid behov upprepas behandlingen om 1-2 månader.

Om det uppstår problem

Kontakta den vårdande enheten eller dejouren ifall du får

- kraftigt magont som inte lättar med smärtstillande medicin
- riklig kontinuerlig blödning
- över 38 grader feber