

Behandling av hudförändringar med imikvimodkräm (Zyclara)

Zyclara kräm, vars aktiva substans är imikvidom, har valts som behandling för dina hudförändringar. Den används för behandlingen av aktinisk keratos i ansiktet och på skalpen.

Användning

- Används vanligen dagligen i två veckor, varefter du håller en två veckors paus. Använd dock alltid krämen enligt läkarens anvisning.
- Krämen appliceras på ren hud före sänggående och får verka i cirka åtta timmar. Du får varken väta eller täcka området under verkningstiden.
- Tvätta händerna noga före och efter appliceringen. Undvik att få krämen i ögonen, på läpparna, i munnen och i näsborrarna.
- Tvätta bort krämen efter åtta timmar.

Att beakta

- Imikvimod orsakar en inflammatorisk reaktion på det behandlade området. Det här går om och är inte farligt.
- Symtom på inflammatorisk reaktion är hetta, rodnad, svullnad och en brännande känsla på det behandlande hudområdet. Dessutom kan hudexfoliering, klåda, smärta, ytliga sår och skorvbildning förekomma.
- Om den inflammatoriska reaktionen är obehagligt kraftig, kan du ta en paus från krämen och kontakta hudpolikliniken på ÅUCS.
- För att undvika att huden på det behandlade området bränns, ska du skydda området från sol med hjälp av kläder och solkräm.

Förvaring

- Förvaras vid högst 25°C.
- Krämen är doserad i dospåsar.
- Öppnade dospåsar får inte återanvändas.