

Botulinumtoxinbehandling under anestesi

Ditt barn ska komma för botulinumtoxinbehandling som görs under anestesi. Det är viktigt för barnet att få rätt information för att bevara sin trygghetskänsla och inte förlora sin tillit. Därför ska du tala med barnet om sjukhusvistelsen och åtgärden hen ska genomgå.

Förberedelser inför undersökningen

Hemma före ankomsten till sjukhuset

Barnet ska tvätta sig kvällen före åtgärden. Ägna särskild uppmärksamhet åt att området som ska behandlas blir rent.

På grund av anestesi ska barnet vara utan näring före åtgärden. Att vara utan näring hindrar barnet från att kräkas under anestesi.

- Barnet får inte äta fr.o.m. klockan 6.00. Modersmjölk och modersmjölkersättning kan ges senast fyra timmar före åtgärden. Normal mjölk får inte drickas efter klockan 6.00.
- Hemma får barnet dricka vatten eller klar saft högst 2 dl tills det är en timme kvar till ankomsten till sjukhuset.
- Hemma på morgonen kan barnet ta sina regelbundna mediciner med lite vatten.
- Multivitamin- och spårämnespreparat får barnet inte ta på undersökningsmorgonen, om det inte är absolut nödvändigt. Vid behov kan du fråga om anvisningar beträffande vitaminerna.

Åtgärdsdagen på sjukhuset

När ni anländer till avdelningen smörjer man barnets handrygg med bedövningssalva för insättning av en kanyl. En av föräldrarna får följa med barnet till åtgärdsavdelningen och stanna vid barnets sida tills hen sövs ner. Åtgärder på operationssalen genomförs fr.o.m. cirka klocka 13.

Efter åtgärden följs barnets tillstånd upp i uppvakningsrummet och sedan på avdelningen. Utskrivningen sker efter tillräcklig observation och enligt barnets mående. Inför hemresan behöver barnet en följeslagare som inte samtidigt är bilförare – med taxi räcker en följeslagare. Barnet får inte lämnas ensam under anestesidagen.

Vi svarar gärna på frågor,

vårdbokaren för barn och unga, kan nås vardagar klockan 8 - 14, på telefonnumret 02 313 2429