

ENDOSKOPI AV LUFTRÖREN OCH PROVTAGNING MED HJÄLP AV ULTRALJUD

Endoskopi av luftrören (bronkoskopi) är en undersökning där läkaren tittar in i dina luftvägar. Med hjälp av bronkoskopin kan läkaren reda ut de förändringar som har framkommit i röntgenundersökningen eller i andra avbildningsundersökningar, och därmed säkerställa diagnosen samt planera den fortsatta vården. Undersökningen är smärtfri och luftvägarna hålls öppna under hela undersökningen.

Förberedelser inför bronkoskopin

Före undersökningen:

- du ska avstå från att äta, dricka eller röka i fyra timmar innan undersökningen
- morgonmedicinerna får du ta normal tid med en liten skvätt vatten
- ifall du använder **blodförtunnande läkemedel**, har **epilepsi** eller **diabetes som behandlas med insulin**, kontakta undersökningsenheten vid lungmedicinska polikliniken
- om du har en eller flera konstgjorda leder, hjärtklaffsläckage eller har en klaffprotes; berätta om saken åt personalen och försäkra att du får antibiotikaproylax innan bronkoskopin
- du bör avlägsna alla piercingar från ansiktet eller öronen (t.ex. örhängen, näs- och munsmücken) före undersökningen
- du får lugnande medicin via en venkanyl just innan ingreppet

Hur undersökningen utförs

Svalgen lokalbedövas med en spray. Efter bedövningen får du lugnande medicin via en venkanyl. Du somnar inte av den lugnande medicinen, men den gör dig dåsig och sömning. Bronkoskopin utförs med hjälp av en tunn och böjlig slang. Du ligger på rygg då undersökningen utförs. Med hjälp av bronkoskopet granskas luftrören och nödvändiga prov tas. Undersökningen tar ca en timme.

Efter bronkoskopin

Efter bronkoskopin är du under observation i minst en timme, någondera på undersökningsenheten eller på bäddavdelningen. Du får åka hem när du mår bra och har fått lov att lämna avdelningen. Om du har kommit till bronkoskopin via bäddavdelningen, är det avdelningsläkaren som hemförlovar dig. Resultaten från de tagna proven fås ungefär inom två veckor.

Efter undersökningen:

- efter undersökningen får du inte äta på 3 timmar eftersom svalget är bedövat
- försök att inte hosta hårt för att undvika irritation i luftvägarna
- avhåll dig från tobaksrökning för att undvika irritation i luftvägarna
- förbered dig för att stanna kvar på observation i **1-2 timmar** efter bronkoskopin dvs. tills effekten av medicinen som du har fått under undersökningen har minskat.

- du bör avhämtas från sjukhuset av en annan vuxen. Dessutom bör du ha en vuxen som sällskap den efterföljande kvällen och natten.
- samma dag som undersökningen har utförts får du inte köra motorfordon eller utföra uppgifter som kräver noggrannhet. Läkemedlen som ges före och under bronkoskopin påverkar prestationsförmågan och kan trötta ut dig ännu flera timmar efter själva undersökningen.

Om du har frågor gällande bronkoskopin, kontakta under tjänstetid undersökningsenheten vid lungmedicinska polikliniken.

Vid möjliga problem kontakta den vårdande enheten, jousen i din hemkommun eller samjousen.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.