

Endoskopi av luftrören/matstrupen

Endoskopiundersökning

Endoskopin utförs under narkos eller bedövning. I bedövningen utförs endoskopin via munnen eller näsan med ett tunt och böjligt endoskop. Om endoskopin utförs via munnen med ett stelt, metalliskt endoskop, sker undersökningen under narkos. Man kommer till sjukhuset vid en på förhand fastställd tidpunkt. Ibland är man tvungen att göra endoskopin oväntat som jourundersökning. Endoskopin utförs på operationssalen. I samband med undersökningen kan man ta provbitar, skölja och ta sköljprov samt avlägsna främmande kroppar.

Efter åtgärden

Du får åka hem möjligen redan samma dag enligt läkarens anvisning.

Efter endoskopin ska du vara utan att äta och dricka 2-3 timmar eller en längre tid enligt läkarens ordination. Börja med att dricka lite vatten. Om du inte har några problem med att dricka kan du börja äta mat som är lätt att svälja (till exempel yoghurt, fil, kräm).

Normala symtom 1–2 dagar efter åtgärden är ovanligt riklig slemsekretion, sträv i halsen, hostretning och en känsla av klump i halsen. Även blodstrimmor i slemmet är normala framför allt om det har tagits provbitar under endoskopin.

Du ska ta smärtstillande mediciner enligt behov. Läkaren ger eventuella recept och ordinationer innan du reser hem. Sjukledigheten är en dag (åtgärdsdagen).

Eventuella problem

Om något av följande problem uppstår, kontakta det sjukhus som utfört åtgärden:

- hård och tilltagande smärta
- kraftig blödning ur munnen eller näsan
- andningssvårigheter
- feber stiger till 38 grader eller över
- hes röst som uppstår först efter åtgärden och som pågår flera dagar.