

## Endoskopi av tunntarmen alltså enteroskopi

Endoskopin utförs för att konstatera en sjukdom i tunntarmen då man med endoskopi av magsäcken, alltså gastroskopi, inte kunnat få klarhet i saken. I samband med undersökningen kan man även utföra vårdåtgärder.

### Förberedelser hemma före endoskopin

- Ät, drick eller rök inte 6 timmar före undersökningen.
- Tugga inte tuggummi före endoskopin, för det orsakar luft i tarmen.
- Kontakta den vårdande enheten i förväg ifall du använder mediciner som påverkar blodets koagulering (bl.a. Marevan®)
- Morgonmedicinen kan tas efter endoskopin, undantagsfall kan diskuteras med läkaren.

### Endoskopins förlopp

Svalgen bedövas med spray och man sätter bedövande gel på endoskopet. Endoskopet förs via munnen till matsmältningskanalen. Vid behov kan man ge lugnande medicin under undersökningen. Man ligger på vänstra sidan på undersökningsbordet.

### Efter endoskopin

Du får äta och dricka efter endoskopin med följande undantag:

- Om svalgen bedövats, skall man vänta att bedövningen slutat verka, så att inte maten och drycken hamnar i luftvägarna. Bedövningen räcker i ca en timme.
- Om det har tagits biopsier, skall man på undersökningsdagen undvika värkmediciner som irriterar magen p.g.a. risk för blödning. Andra mediciner kan man ta normalt.

### Om det under endoskopin har använts lugnande medicin

- Följs ditt tillstånd 1-2 timmar efter endoskopin.
- Du skall ha en följeslagare på hemresan och som spenderar kvällen med dig.
- Du får inte köra bil eller annat motorfordon på undersökningsdagen.

Om det uppstår problem, kontakta den vårdande enheten, hälsocentralen eller dejouren