

Endoskopisk värmebehandling av matstrupen

Före undersökningen

- Ät och drick inte från kl 24 föregående kväll.
- Pausa blodförtunnande medicin.
- Före undersökningen sätts en kanyl i din arm.

Undersökningen

- Via kanylen ges lugnande- och smärtstillande medicin.
- Svalgen bedövas med spray.
- Du ligger på sida på undersökningsbordet under undersökningen.
- Andningsvägarna hålls öppna under hela undersökningen.
- Undersökningens längd är ungefär 30 minuter.

Efter undersökningen

- P.g.a. medicineringen kan svalgen kännas bedövad och du kan känna dig sömning.
- Om du mår bra får du äta och dricka cirka två timmar efter undersökningen.
- Ät flytande kost under en veckas tid (bl.a. soppor, drycker, saftsoppor, puré, fil o.s.v.). Vid behov kan du använda energirika näringsdrycker som kan köpas på apoteket.
- Ditt hälsotillstånd följs upp till eftermiddagen för eventuella komplikationer.

Utskrivning och efterkontroll

- Du får åka hem på eftermiddagen med en följeslagare.
- Eventuell efterkontrolltid får du vid utskrivningen.

Magsyrehämmande medicin (bl.a. Somac®, Nexium®, Zolt®)

- Använd magsyrehämmande medicin med dubbeldos fyra veckor.
- Fortsätt med normal dos efter det.

Problemsituationer

Kontakta den vårdande enheten eller jouren.