

Förberedelser inför hudkirurgiskt ingrepp

- Hudkirurgiska ingreppet görs i lokalbedövning.
- Innan ingreppet får du äta och dricka normalt.
- Det rekommenderas att duscha samt tvätta håret innan ankomsten till polikliniken.
- Ifall operationen riktar sig till ansiktsområdet, kom utan smink och smycken.
- Ifall du använder preparat med acetosalisylysyra (Aspirin, Disperin, Primaspan), ber vi er avsluta medicinanvändningen fem dagar innan ingreppet.
- Användning av preparat med acetosalisylysyra bör inte uppehållas, ifall det tidigare, i samband med kranskärls-ingrepp, insatts nervtrådanslutningsrör för medicinskt bruk.
- Medicinen kan påbörjas igen en dag efter ingreppet.
- Ifall du använder blodförtunnande medicin (t.ex. Marevan) ber vi dig kontakta din vårdande läkare och förhandla om möjligheten till att vid behov minska på dosen av blodförtunnande medicinen.
- För att undvika blödning ur sårområdet, torde Marevan medicineringens uppföljningsvärde vara under två innan ingreppet.

Efter ingreppet

- Efter ingreppet får du genast åka hem, ifall inte annat varit överenskommet tidigare.