

Glaskroppsinjektion

Ingreppet utförs i lokalbedövning. Läkemedel injiceras i ögat med en nål. Läkemedlets uppgift är att förhindra att nya, felaktiga blodkärl bildas och att dessa läcker vätska under näthinnan. Syftet är också att förhindra en försämring av synen. Ingreppet förutsätter återkommande kontrollbesök.

Förberedelser inför glaskroppsinjektion

- Reservera ca 1 timme för besöket.
- Duscha och tvätta håret. Du kan äta normalt och ta dina mediciner hemma, om du inte har fått andra anvisningar.
- Observera att ögonfransförlängningar inte är tillåtna för injektionspatienter på grund av förhöjd infektionsrisk

Efter glaskroppsinjektion

- Vät inte ögat under behandlingsdagen. Följande dag kan du tvätta dig normalt
- Undvik motion som gör dig svettig, lyft inte över 5 kg, undvik även simning och bastubad ingreppsdagen och följande dag
- Undvik att trycka och gnugga det behandlade ögat under en vecka efter behandlingen
- Du kan vistas ute normalt. Du kan använda glasögon eller solglasögon ifall att vind eller kyla irriterar.
- Undvik att använda kontaktlins under en vecka efter behandlingen
- Observera att **det inte är tillåtet att köra bil** genast efter ingreppet. Du kan köra bil då synen återgått till samma nivå som innan ingreppet
- Om arbetet kräver sjukledighet, är sjukledighetens längd ingreppsdagen och följande dag

Särskilt att beakta

- En känsla av skräp i ögat, att ögat rinner och att du ser prickar som rör sig i synfältet är normala symptom som kan förekomma under den första tiden efter ingreppet. Med tiden försvinner dessa symptom.
- Du kan använda fuktgivande ögondroppar ur engångspipetter, som du kan köpa receptfritt på apoteket (t.ex. Oftagel®/Viscotears®). Du kan på börja droppandet 3 timmar efter ingreppet
- Informera vårdpersonalen i god tid före injektionen om nyligen utförda eller planerade operationer och tandläkarbesök (tiden varierar mellan några dygn till flera veckor)

- Informera vårdpersonalen i god tid före injektionen om du har en infektion eller nya ögonsymptom
- Om det uppstår smärta i det behandlade ögat, det blir ljuskänsligt eller det uppstår något annat avvikande, ta kontakt med ögonpolikliniken telefon 02 313 1520.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.