

Information för föräldrarna om propranolol -medicinering

Propranolol medicinering kommer att påbörjas som behandling av hemangiom hos ert barn.

Början av vården

Vården med medicinen påbörjas polikliniskt eller på avdelningen oberoende av ålder. Läkaren undersöker ert barn innan vården påbörjas. Vård som påbörjas på avdelningen 1-2 dagar. Under den tiden följer man blodtrycket och blodsockerhalterna som kan sänkas av medicineringen.

Medicinering och mat

Genom att äta regelbundet kan man förhindra att blodsockerhalten blir för låg. Det får inte bli för långa pauser mellan måltiderna. Medicinen ges strax innan måltiderna.

- under 6 veckor gammal barn maximum tid mellan måltider är 4 timmar
- 6 veckor – 4 mån gammal barn maximum tid mellan måltider är 5 timmar
- över 4 mån gammal barn maximum tid mellan måltider är 6-8 timmar

Tag kontakt med den vårdande enheten ifall barnets aptit försämras betydligt på grund av till exempel kräkningar, diarré eller hög feber.

Dosering av medicinen

Medicinen ges till barnet dagtid. Tidpunkterna för medicineringen planeras så att medicineringen ges med minst 6 timmars mellanrum och dagens sista dos ges på kvällen klockan 19. På detta vis förhindrar man en eventuell risk att blodsockerhalten sjunker lågt under natten, då det är en längre paus mellan måltider.

Då ert barn böjar i dagvård kan doseringen av praktiska skäl sänkas till två dagsdoser. Tag kontakt med barnets vårdande enhet ifall hemangiomen börjar växa oväntat.

Uppföljning under medicineringen och att sluta med medicineringen

Uppföljningsbesök bokas in 4-6 veckor efter påbörjan av medicineringen, och efter det med ett mellanrum på 3-4 mån. Vården avslutas vanligtvis i 12-14 mån ålder men kan fortsätta även längre. Medicineringen avslutas under 2-4 veckors tid genom att trappvis minska doseringen.