

Implantation av en trådlös pacemaker

Hjärtats rätta rytm är tillräcklig för blodcirkulation. Ifall hjärtats egna förmåga att styra rytmen är försämrad, installeras en pacemaker. Pacemakern hjälper hjärtat att fungera normalt genom att ge impulser som får hjärtmusklerna att kontraheras enligt en regelbunden och passlig rytm. På detta vis minskas blodcirkulationens störningars inverkan, vilka kan orsaka symptom som begränsar livet såsom svindel, trötthet, svaghet och andfåddhet.

Den trådlösa pacemakern installeras, i lokalbedövning, genom ljumskvenen till hjärtats högra kammare. Åtgärden tar cirka en timme. Komplikationer som kan förekomma (är infektion, blödning och fyllnad av hjärtsäcken) men det är sällsynt.

Före åtgärden

- Du får en skild anvisning om medicineringen och om att vara oäten
- Duscha och tvätta håret dagen före åtgärden
- Observera redan innan du kommer till sjukhuset, att det är förbjudet att köra bil i minst tio dagar efter åtgärden.

Efter åtgärden

Du har sängvila efter åtgärden minst 4 timmar efter åtgärden eller tills punktionsställets stygn är borttaget.

Utskrivningen sker vanligtvis följande dag efter åtgärden. Efter åtgärden justeras pacemakerns funktion med hjälp av en programmeringsapparat.

Hemma efter åtgärden

Vanligtvis återhämtar punktionsstället i ljumskven sig inom en vecka, varefter det inte finns begränsningar för vanliga dagliga funktioner. För att försäkra sig om punktionsställets läkning bör man under en vecka undvika

- tunga fysiska aktiviteter, långa promenader och bastubad
- det är bra att stöda med handen punktionsstället exempelvis vid hosta de första dagarna efter åtgärden

Kontakta vårdande enhet

- Om du har feber eller en infektion. Observera också munnens och tändernas skick.
- Om du misstänker att du är gravid. Under åtgärden används röntgenstrålar.

Sydänsairaudet.fi bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.