

Installation av EKG-monitor

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Allmänt om undersökningen

EKG-monitorn läggs under lokalbedövning in under huden till vänster i trakten av I-IV revbenet nära bröstbenet. Åtgärden och handledningen tar ungefär 1-2 timmar.

Förberedelser före åtgärden

- Ta dina mediciner normalt.

Efter åtgärden

- EKG-monitorn programmeras och du får handledning i användningen av EKG-monitorn.

Sårskötsel

- Ni kan avlägsna förbandet från såret då det gått ett dygn (24 timmar) från åtgärden. Vid behov kan du täcka såret med en ren kompress som man köper från apoteket.
- Från nästa dagen får man duscha såret lätt. Torka såret med en ren handduk genom att trycka lätt. Man bör undvika bastubad och simning i två veckor.
- Såret läker vanligtvis väl då man håller det rent och torrt och det får luft.

Undvik att använda kläder som stramar eller skavar ända tills såret läkt ordentligt.

Suturerna avlägsnas: _____ / _____ 20_____.

Boka själv en tid hos en hälsovårdare till exempel vid din hälsovårdscentral.

Ta kontakt med den vårdande enheten ifall

- Det uppstår tilltagande smärta.
- Det kommer kontinuerligt blod eller annat sekret från såret.
- Du får feber (över 38 grader).
- Det uppstår tilltagande hetta, svullnad eller rodnad på såret.

Sydänsairaudet.fi bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.