

Klamydia

Klamydiainfektion är en av de vanligare sexuellt överförbara sjukdomarna, som orsakas av en intracellulär bakterie, Chlamydia trachomatis.

Symtom

- En klamydiainfektion är oftast symtomfri för kvinnor, men även många män får klamydia utan att meddela det. Om symtom uppstår, börjar de oftast en eller två veckor efter infektionen. Symtomen kan även uppstå långt senare.
- **Klamydiasymtom hos en kvinna är en ökad vit flytning och sveda vid urinering samt smärtor i nedre buken och ryggsmärtor.**
- **För män är symtomen sveda vid urinering, förtätat urineringsbehov och slemmig eller varig utsöndring.**
- En obehandlad klamydiainflammation kan utvecklas till en bitestikelinflammation eller inflammation i de inre könsorganen, som kan orsaka barnlöshet eller extrauterin graviditet.
- Klamydia kan orsaka även ögoninflammation och ledinflammation som följsjukdom. En nyfödd kan smittas med klamydia från förlossningskanalen, vilket orsakar ögoninfektion eller lunginflammation.

Diagnostisering

- Klamydia diagnostiseras utgående från sexvanorna med ett prov som tas från livmoderhalsen, urinen, svalget eller ändtarmsmyningen.

Behandling

- Klamydia behandlas med antibiotika som tas per oralt.
- Behandlingen är enligt lagen om smittsamma sjukdomar avgiftsfri på allmänna sjukhus och hälsostationer.
- Att samtidigt behandla partnern är synnerligen viktigt. Den som insjuknat i klamydia är skyldig att meddela sina partner om sjukdomen och uppmana dem att söka sig till undersökningar.
- Patienten måste använda kondom tills efterundersökningen har utförts.