

MRI-undersökning som utförs under nedsövning (anestesi)

Ert barn ska komma till avdelningen för en magnetresonansundersökning (MRI-undersökning) under anestesi. Undersökningen tar cirka 1 timme. Barnet ska ligga stilla under undersökningen, därför sövs barnet.

Förberedelser inför undersökningen

Barnet får på grund av nedsövningen inte äta före undersökningen, för att förebygga kräkning under undersökningen. Ifall barnet inte klarar av att vara utan att äta, kan inte undersökningen göras.

- Barnet får inte äta på morgonen före undersökningen. Kvällen före undersökningen kan barnet äta normalt. Modersmjölk eller modersmjölksersättning kan man ännu ge 4 timmar före ni kommer till sjukhuset.
- En liten mängd ($\frac{1}{2}$ - 1 dl) vatten eller klar saft får man dricka 1 timme före ni kommer till sjukhuset.
- Mediciner som barnet använder regelbundet kan man på morgonen ta hemma med ett litet glas vatten.
- Om barnet blir sjukt eller ni behöver mer information om undersökningen, kontakta avdelningen tel. 02 313 1412 eller 02 313 0484.
- **Ankomsttiden till sjukhuset meddelas med SMS dagen innan undersökningen.**

På undersökningsdagen på sjukhuset

- Föremål av metall (t.ex. smycken, tandställningar, insulinpump) eller andra främmande föremål ska avlägsnas före undersökningen. Berätta för skötaren om ert barn har ett främmande föremål (t.ex. en shunt) som innehåller metall i kroppen.
- På avdelningen används bedövningskräm och lugnande premedicinering i form av nässpray innan den intravenösa kanylen sätts in.
- Barnet förs till undersökningen i en säng. Föräldrarna har möjlighet att följa barnet till undersökningsavdelningen och vara bredvid barnet ända tills nedsövningen.
- Förbered er att undersökningsdagen tar cirka 6 timmar med alla förberedelser.

Efter undersökningen

När barnet har vaknat, får barnet först dricka och sedan äta efter måendet.

Barnet får åka hem, när måendet är bra. För hemresan ska barnet ha en ledsagare som inte samtidigt kan fungera som bilförare. Välkommen!