

Metakolinexpositionstest

Med hjälp av undersökningen utreder man kontraktionskänslighet av luftrören, dvs. känsligheten att reagera på stimulus.

Förberedelser inför undersökningen:

- 1 dygn inför undersökningen får man inte dricka alkohol
- 4 timmar inför undersökningen får man inte dricka kaffe, te, coladrycker eller andra stimulerande drycker, inte heller får man äta choklad
- 2 timmar inför undersökningen får man inte röka eller använda andra nikotinprodukter
- 2 timmar inför undersökningen skall man undvika kraftig fysisk ansträngning
- du kan äta lätt inför undersökningen
- användning av parfymer på polikliniken är förbjuden

Expositionstest med metakolin tar cirka 1 ½ timmar.

Undersökningen görs när patienten har så få symptom som möjligt

- akut luftvägsinfektion eller andningssvårigheter hindrar genomföringen av undersökningen
- det skall ha tagit 4 veckor av tillfrisknandet men med läkarens beslut kan undersökningen göras också tidigare

Undersökningen genomförs inte för gravida patienter.

I fall du använder följande mediciner, skall du pausera användning av dem på följande sätt:

12 timmar inför testet:

- Airomir, Bricanyl, Buventol, Ventoline
- Rinexin, Lomudal, Efedrin

1 dygn inför testet:

- Atrovent, Atrodual, Atrovent comp, Tilade, Ipratropium/Salbutamol, Intal

2 dygn inför testet:

- Cycloterol, Fomeda, Foradil, Formaxa, Formoterol, Oxis, Serevent

3 dygn inför testet:

- Duaklir, Eklira, Spiriva, Retafyllin, Theofol, Theofol comp, Aminocont, Incruse, Anoro, Inspiroto, Onbrez, Striverdi
- **Alla hostmediciner**
- **Antihistaminer och mediciner som innehåller antihistamin:** Aerinaze, Aeriuz, Alzyr, Atarax, Benadryl, Careadin, Cetimax, Cetirizin, Cirrus, Dasselta, Desloratadin, Desloratadine, Deslox, Dormix, Duact, Ebastin, Fexofenadine, Flynnise, Heinix, Histec, Hydroxyzine, Kestine, Kestox, Kevenix, Lastin, Levazyr, Levocetirizin, Livostin, Loratadin, Marzine, Nosedan, Peritol, Postafen, Revitelle, Tavegyl, Telfast, Xyzal, Zyrtec

4 dygn inför testet:

- Zafirlucast, Montelukast, Singulair

5 dygn inför testet:

- Daxas

7 dygn inför testet:

- Bevespi, Seebri, Ultibro

4 veckor inför testet:

- Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Budesonid, Flixotide, Novopulmon, Pulmicort, Seretide, Bufomix, Symbicort, Innovair, Flutiform, Relvar, Enerzair Breezhaler, Salfлумix, Salmex, Aectura, Trimbow, Trixeo, Trelegy, Budiair sumute, Fluticason, Salmeson, Salmeterol/Fluticason

Ta kontakt till lungmedicinska polikliniken på vardagar kl. 08.00-15.00 om:

- du har frågor gällande dina mediciner
- du använder tablettkortison
 - Hydrocortison
 - Prednisolon
 - Prednison
 - Medrol
 - Solomet